




**Associazione italiana
registri tumori**

a cura di
Emanuele Crocetti
e AIRTUM Working Group
(www.registri-tumori.it)

i numeri dell'AIRTUM

Tumore della cervice uterina: trend di incidenza per istotipo



I tassi di incidenza delle forme invasive del tumore della cervice uterina dalla fine degli anni ottanta agli inizi del 2000 mostrano una **riduzione statisticamente significativa pari a -1,4%/annuo** (IC95% -2,6;-0,3) dovuta prevalentemente alla riduzione dei tassi nelle donne di età superiore ai 60 anni (-2,8%/anno; IC 95% -4,4;-1,2) e in particolare, sempre in questa fascia d'età, a una riduzione delle **forme squamose** (-2,5%/anno, IC 95% -3,7;-0,8). Gli **adenocarcinomi** e le **forme miste** mostrano una tendenza stabile +0,5%/anno (IC 95% -2,2;+3,2), mentre queste forme sono in netta crescita fra le donne più giovani (20-39 anni), +8,7%/anno (IC 95% +1,9;+16,0). Nello stesso periodo si è osservata una crescita significativa dei tassi d'incidenza delle **forme in situ** +4,6%/anno (IC 95% 2,4;+6,8), che è stata della stessa entità in tutte le età. Queste forme risultano essere quantitativamente 3-4 volte più frequenti delle forme invasive. La riduzione complessiva delle forme invasive e la crescita di quelle *in situ* è da attribuirsi all'effetto della diagnosi precoce che individua prevalentemente le forme preinvasive e che ha mostrato una efficacia più limitata per

le lesioni ghiandolari rispetto a quelle squamose.

Metodi: Sono stati utilizzati i dati della banca dati AIRTUM aggiornata a gennaio 2007. Sono stati selezionati i Registri tumori con casi incidenti per l'intero periodo 1988-2002 (RT Firenze-Prato, Modena, Parma, Romagna, Ragusa). La standardizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. La variazione media annuale dei tassi viene calcolata adattando ai dati una retta di regressione dei minimi quadrati sul logaritmo naturale dei tassi, utilizzando l'anno di calendario come variabile di regressione, secondo la procedura del software SEER*Stat 6.3.5 Le forme morfologiche sono state definite secondo i seguenti codici ICDO-3, K:

■ Squamoso: 8050-8089, 8120-8139. ■ Adenocarcinomi (e forme miste): 8140-8149, 8160-8169, 8190-8229, 8260-8339, 8350-8560, 8570-8579, 8940-8949. ■ Altro: 8000-8049, 8090-8119, 8150-8159, 8170-8189, 8230-8259, 8340-8349, 8561-8569, 8580-8939, 8950-9989.

La composizione dell'AIRTUM Working Group è riportata integralmente sul sito <http://www.registri-tumori.it>