



i numeri dell'AIRTUM

I primi cinque tumori killer in Italia:
1982 e 2002 a confronto

Il confronto dei dati di mortalità ISTAT relativi al 1982 e al 2002 permette di apprezzare alcuni cambiamenti avvenuti in Italia negli ultimi venti anni fra le principali cause di mortalità neoplastica.

Tra gli uomini si inizia ad apprezzare l'effetto della riduzione dei tassi di mortalità per il tumore del polmone che si è confermato comunque nel 2002 la prima causa di mortalità neoplastica; aumenta la quota a carico dei tumori del colon-retto e leggermente anche quella del tumore della prostata.

Tra le donne si osserva una lieve contrazione del tumore della mammella, prima causa di morte tumorale, così come del tumore del colon-retto, mentre aumenta il peso percentuale del tumore del polmone.

In entrambi i sessi si è osservato quasi un dimezzamento del peso percentuale del tumore dello stomaco a conferma di un trend ormai storico di riduzione sia dell'incidenza, sia della mortalità.

Metodi: Sono stati utilizzati i dati di mortalità ISTAT 1982 e 2002 più recenti disponibili presso www.iss.it/site/mortalita/ a cui si rimanda per le avvertenze. I numeri assoluti sono stati riferiti al totale dei tumori (codici della Classificazione Internazionale delle Malattie 9° ed. 140-239).

1982	MASCHI	2002
POLMONE 29,1%	1°	POLMONE 27,6%
STOMACO 11,9%	2°	COLON RETTO 11,3%
COLON RETTO 9,8%	3°	PROSTATA 7,6%
PROSTATA 6,5%	4°	STOMACO 6,7%
VESCICA 4,9%	5°	VESCICA 4,5%

1982	FEMMINE	2002
MAMMELLA 17,7%	1°	MAMMELLA 16,2%
COLON RETTO 14,3%	2°	COLON RETTO 13,8%
STOMACO 11,8%	3°	POLMONE 9,4%
UTERO 7,7%	4°	STOMACO 6,7%
POLMONE 6,2%	5°	PANCREAS 6,2%